

Middel Reg.nr.	Indhold af aktivstof	Max antal behandlinger	Max dosis pr. behandling	Max dosis pr. sæson	Sprøjteinterval	Beh. tidspunkt	Afstandskrav			Bemærkninger	Priis/ha v. max dosis
							Vandmiljø	§ 3-områder	Veje, beboelse		
Ukrudtsmidler											
Agil 100 EC 396-12	100 g/l propaquizafop	1 gang Kun behandling hvert 2. år på samme areal	0,8 L	0,8 L		Tidligst fra st. 11 Senest 30 dage før høst	2				177 kr.
Boxer 1-211	800g/l prosulfocarb	2 gange	4,0 L	5 L	7-10 dage	Anvendes i st. 00-11 Senest 42 dage før høst	10			Minimum 75 % afdriksreduktion	688 kr.
Centium 36 CS 421-2	360 g/l clomazon	1 gang Kun behandling hvert 3. år på samme areal	0,25 L	0,25L		Senest inden fremspiring	2			OBS ved andre clomazon produkter	173 kr.
Fenix 18-417	600 g/l aclonifen	1 gang (2 x 0,25 e. fremspiring)	2,5 L	2,5 L	7 dage ved 2x 0,25 l/ha	Før fremspiring Senest 40 dage før høst	10	15		Off-label: 2 x 0,25 efter fremspiring	975 kr.
Focus Ultra 19-93	100 g/l cycloxydim	1 gang Kun behandling hvert 3. år på samme areal	5,0 L	5,0 L		Anvendes i st. 10-39 Senest 56 dage før høst		5			950 kr.
Metaxon 347-5 U-46 M 347-7	750 g/l MCPA	1 gang Senest 1/8	0,1 L	0,1 L		Senest st. 25	2			Off-label	21 kr.
Novitron DAM TEC 421-7	500 g/kg aclonifen 30 g/kg clomazon	1 gang Kun behandling hvert 3. år på samme areal	2,4 kg	2,4 kg		Senest 5 dage før fremspiring	20			OBS ved andre clomazon produkter	924 kr.
Proman 632-2	500 g/l metobromuron		2,0 L	2,0 L		Senest st. 09, (før fremspiring)	2		10	Minimum 50 % afdriksreduktion	636 kr.

Middel Reg. Nr.	Indhold af aktivstof	Max antal behandlinger	Max dosis pr. behandling	Max dosis pr. sæson	Sprøjteinterval	Behandlingstidspunkt	Afstandskrav			Bemærkninger	Pris/ha v. max dosis
							Vandmiljø	§ 3-områder	Veje, beboelse mv.		
Skadedyrsmidler											
Karate 2,5 WG 1-163	25 g/kg lambda- cyhalothrin	2 gange	0,5 kg	1 kg		Senest 14 dage før høst	20			Produktet er afmeldt. Må anvendes og opbevares indtil 01.07.2021	
Lamdex 396-77	25 g/kg Lambda- cyhalothrin	2 gange	0,5 kg	1 kg		Senest 14 dage før høst	20				231 kr.
Mavrik 396-82	240 g/l tau- fluvalinat	2 gange	0,2 l	0,4 l	14 dage	Anvendes i st. 12-49. Senest 7 dage før høst	10				117 kr.
Mospilan SG 561-3	200 g/kg acetamiprid	2 gange	0,25 kg	0,5 kg		Senest 3 dage før høst	2				187 kr.
Teppeki 352-5	500 g/kg flonicamid	2 gange	0,16 kg	0,32 kg	3 uger	Senest 14 dage før høst					196 kr.

Middel Reg. Nr.	Indhold af aktivstof	Max antal behandlinger	Max dosis pr. behandling	Max dosis pr. sæson	Sprøjte-interval	Behandlings-tidspunkt	Afstandskrav			Bemærkninger	Pris/ha v. max dosis
							Vandmiljø	§ 3-områder	Veje, boliger mv.		
Svampemidler											
Banjo Forte 396-58	200 g/l fluazinam 200 g/l dimethomorph	4 gange	1 L	4 L	5-10 dage	Anvendes i st. 31-91. Senest 7 dage før høst	10				253 kr.
Cymbal 45 632-4	450 g/kg. cymoxanil	6 gange	0,25 kg	1,5 kg	7 dage	Anvendes i st. 19-91. Senest 7 dage før høst	2			Skal anvendes i blanding med andre skimmelmidler	71 kr.
Dithane NT 804-1 (+ Tridex)	750 g/kg manoczeb	8 gange	2 kg	16 kg	7 dage	Tidligst fra st. 32 Senest 7 dage inden høst	10			Produktet er afmeldt. Må anvendes og opbevares indtil 01.01.2022	
Narita 613-11	250 g/l difenconazol	3 gange	0,4 L	1,2 L	10 dage	Anvendes i st. 40-91 Senest 14 dage før høst	10			Brug af andet difenconazol (Revus Top) skal modregnes max dosis. Max 300g difenconazol pr. ha.	108 kr.
Option 3-187	600 g/kg cymoxanil	8 gange	0,2 kg	1,6 kg	5-10 dage	Anvendes i st. 15-93 Senest 1 dag før høst					Ukendt
Propulse SE 250 18-597	125 g/l prothioconazol 125 g/l fluopyram	2 gange	0,45 L	0,9 L	10 dage	Anvende senest i st. 89 og før 1/10	2		2		168 kr.

Proxanil 361-15	333,6 g/l propamocarb 50 g/l cymoxanil	6 gange	2,5 L	15 L	7 dage	Tidligst fra kartoflerne er 15 cm høje Senest 14 dage før høst	2				537 kr.
Ranman Top 352-8	160 g/l cyazofamid	6 gange Maks 3 gange i træk	0,5 L	3 L	7 dage	Senest 7 dage før høst	2				190 kr.
Revus 1-195	250 g/l mandipropamid	6 gange eller max 50 % af behandlingern e	0,6 L	3,6 L	7-10 dage	Anvendes i st. 20-91 Senest 3 dage før høst	2				186 kr.
Revus Top 1-218	250 g/l difenoconazol 250 g/l madipropamid	2 gange Kun behandling hvert 3. år på samme areal	0,6 L	1,2 L	14 dage	Anvendes i st. 40-91 Senest 3 dage før høst	10			Brug af andet difenoconazol (Narita) skal modregnes max dosis. Max. 300g difenconazol pr. ha.	258 kr.
Shirlan Ultra 352-13	500 g/l fluazinam	10 gange	0,4 L	4,0 L	5-7 dage	Anvendes i st. 32-91 Senest 7 dage før høst	10				210 kr.
Signum WG 19-151	67 g/kg. pyraclostrobin 267 g/kg boscalid	4 gange	0,25 kg	1 kg	5-10 dage	Senest 3 dage før høst	2			Anvendes i blanding med andet skimmelmiddel	147 kr.
Vendetta 11-58	375 g/l fluzinam 150 g/l azoxystrobin	3 gange	0,5 L	1,5 L	7 dage	Anvendes i st. 41-97 Senest 7 dage før høst	10				262 kr.
Zignal 500 SC 11-35	500 g/l fluzinam	4 gange	0,4 L	1,6 L		Anvendes i st. 32-91 Senest 7 dage før høst	10				206 kr.
Amistar 1-172	250 g/l azoxystrobin	2 gange	0,5 L	1 L	2. behandling efter st. 59.	Anvendes i st. 51-85 Senest 7 dage før høst	10				120 kr.

Middel Reg. Nr.	Indhold af aktivstof	Max dosis pr. ha	Max dosis ved lægning	Max dosis på rullebord	Blandingsanvisninger			Bemærkninger	Pris/ha v. max dosis
					Hardi-teknik	Viby-teknik	Rullebord		
Bejdsemidler									
Monceren DS 12,5 18-264	125 g/kg Pencycuron	6 kg	200 g/hkg	Ikke tilladt	Kartoflerne overpudres lagvis i vogn eller lægger eller ved montage af pulverbejdseanlæg på læggeren			Produktet er afmeldt. Må anvendes og opbevares indtil 01.11.2021	
Monceren FS 250 18-265	250 g/l Pencycuron	1,5 L (1,8 L ved rullebord)	60 ml/ 100 kg	1 L/ton	60-80 L vand/ha	2-4 L vand/tons	0,6-1 L væske/tons	Produktet er afmeldt. Må anvendes og opbevares indtil 01.11.2021	
Maxim 100 FS 1-194	100 g/l fludixonil	0,625 L	0,625 L/ha	250ml/ ton	30-40 L væske/ton		1 L væske/ton		428 kr.
Rizolex 50 FW 526-3	500 g/l tolclofos- methyl	0,75 L		0,3 L/ton					320 kr.
Rizolex 10 D 526-2	100 g/kg tolclofos- methyl		100 g/hkg		Kartoflerne overpudres lagvis i vogn eller lægger eller ved montage af pulverbejdseanlæg på læggeren			Produktet er afmeldt. Må anvendes og opbevares indtil 02.03.2022	
Diabolo 631-8	100 g/l imazalil	150 ml/ton						Behandling af kartoflerne sker ved indlagring. Den maksimale mængde bejdsede læggekartofler, som senere må udlægges, er 7 ton/ha	Ukendt