

Tabel 1. Effekt af ukrudtsmidler i kartofler. Dosis er angivet pr. ha.

Midler	Centium 36 CS ¹⁾	Fenix	Boxer	Novitron	Proman
Dosis	0,25 l	2,0 l	4,0 l	1,8 kg	2 l
<i>Tokimbladet ukrudt</i>					
Burresnerre	8	8	8	9	5
Førglemmigej	7	9	8		-
Fuglegræs	9	9	9	9	9
Gulurt					-
Gåsefod, hv. m.	7	9	5	8	9
Bynke, grå ²⁾					-
Hanekro	6	8	8	7	8
Haremad	8	8	<	8	-
Hejrenæb					-
Hundepersille	8				6
Hyrdetaske	9	9	9	9	9
Jordrøg		8	<	8	7
Kamille, lugtløs	5	7	5	7	8
Kamille, skive	5	7	5	7	8
Kantbæger	9	<	<	9	9
Kornblomst	7	-	<		-
Limurt, nat		8			-
Kål, ager	<	9	<	9	6
Natskygge, sort	8	<	9	8	7
Nælde, liden	8	8	<		-
Okseøjle, gul		<	<		-
Pengeurt	7	9		9	9
Pigæble	9	<	<	9	9
Pileurt, bleg	7	8	5	8	8
Pileurt, fersken	7	8	5	8	8
Pileurt, snerle	6	7	5	8	7
Pileurt, vej	7	7	5	8	7
Raps	<	9	<	9	9
Sennep, ager	5	9	<	9	9
Stedmoder, ager	<	8	5	8	9
Storkenæb		8	<	8	5
Svinemælk, alm.	<	7	<	7	8
Svinemælk, ager ²⁾	<	7	<	7	8
Tidsel, ager ²⁾	<	6	<	6	-
Tvetand	8	9	9	9	8
Valmue, korn	<	9		9	-
Ærenpris, mark	8	9	7	9	9
Ærenpris, storkronet	8	9	7	9	7
<i>Græsser</i>					
Alm. Rajgræs	<	<	<		-
Enårig rapgræs	6	6	7	7	8 ⁴⁾
Flyvehavre			7		-
Grøn skærmaks					-
Hanespore				6	8
<i>Rodukrudt ³⁾</i>					
Kvik, alm.	0	0	0	0	0
Svinemælk, ager					0
Tidsel, ager					0
Skræppe, kruset					0
Gråbynke					0

Procent effekt

9 => 90

8 => 80

7 => 70

5 => 50

< =< 50

1) Centium bør anvendes senest 5 dage før kartoflernes fremspirring pga. svidningsfare

2) Gælder nye frøfremspirede planter, men ikke etableret rodukrudt.

3) Kvik med 3-5 blade og rodukrudt 5-10 cm.

4) Proman har begrænset effekt mod enårig rapgræs, som spirer frem senere på sæsonen.

*Effekt variabel afhængig af vokslag.